

než běžná populace. Očkovat se vakcínou Pfizer je pro vás bezpečné.

60. Během posledních několika let jsem měl/a několik záchvatů anafylaxe a konkrétní spouštěč nebyl identifikován. Nosím EpiPen. Mám zvýšené riziko reakce na vakcínu Pfizer?

V tomto případě je dobré předpokládat, že máte vyšší riziko alergické reakce na vakcínu Pfizer než ostatní. Pokud již máte svého alergologa, promluvte si s ním o rizicích a výhodách tohoto očkování. Zeptejte se ho, zda byste měli před podáním vakcíny provést nějaké testování. Toto testování může upřesnit nejen bezpečnost současné vakcíny Pfizer, ale také to, zda mohou být budoucí vakcíny proti covidu-19 pro vás bezpečné.

61. Jako dítě jsem byl/a alergický na penicilin a jiná antibiotika. Myslím, že mi to dokonce způsobilo vyrážku. Hrozí mi vážná reakce na vakcínu Pfizer?

Větší riziko alergické reakce na vakcínu Pfizer u vás nehrozí. Můžete se nechat očkovat vakcínou Pfizer, je to pro vás bezpečné. Možná bude dobré prokonzultovat se svým ošetřujícím lékařem návštěvu u alergologa. Nedávný výzkum ukázal, že mnoho alergií na penicilin a další antibiotika zjištěných v dětství nepřetrvává do dospělosti.

62. Pokud mám anafylaktickou reakci na vakcínu Pfizer na očkovacím místě, co se stane dál?

Ošetřili bychom vás a stabilizovali. Udělali bychom vám specifické krevní testy, které vám pomohou diagnostikovat anafylaxi. Poté bychom vás odkázali na kliniku pro léčbu alergií na léky na specializované testování a krevní testy.

63. Pokud se rozhodne, že jsem vystaven/a vyššímu riziku a budu požádán/a, abych počkal s očkováním vakcínou proti covidu-19 kvůli konkrétním alergiím, co se stane dál?

Odkážeme vás na kliniku pro léčbu alergií na léky a poradíme, jak se v budoucnu očkovat.

64. Pokud dostanu covid-19 po očkování, znamená to, že mě vakcína nakazila?



Ne. Vakcína vás nemůže nakazit. Pokud jste po očkování onemocněli, znamená to, že jste virus chytili dříve, než jste byli chráněni.

65. Mám si pro vakcínu přijít, pokud nemám covid-19, ale byl/a jsem v rizikovém kontaktu s někým, kdo ano?

Pokyny CDC spočívají v tom, že každý, kdo byl vystaven kontaktu s covidem-19, musí dodržovat všechna pravidla karantény. Pokud jste byli v úzkém kontaktu s někým, kdo je nakažený, odložte prosím své očkování, dokud neskončí vaše karanténa. Je to kvůli bezpečnosti všech a pro zabránění šíření covidu-19. Postupujte podle stejných pokynů pro obě očkování. Pokud jste již podstoupili své první očkování, můžete po skončení karantény dostat druhé. Neovlivní to vaši imunitní odpověď. A nebudete muset opakovat svou první dávku.

Pamatujte, že CDC říká, že jakákoliv z těchto věcí se považuje za blízky kontakt:

- strávili jste 15 minut nebo déle do dvou metrů od někoho, kdo je infikován,
- pečujete o někoho, kdo je nakažený,
- objali nebo políbili jste někoho, kdo je nakažený,
- sdíleli jste nádobí, jídlo nebo pití s někým, kdo je nakažený,
- byli jste v okolí někoho, kdo byl nakažen, a kýchl, kašlal nebo se na vás mohly nějak jinak přenést kapánky z dýchacích cest.

66. Pokud jsem v kontaktu s někým, kdo byl poté covid-19 pozitivní, musím do karantény, i když jsem už po obou dvou očkováních proti covidu-19?

Ano, stále musíte jít do karantény.

67. Jak se po vakcíně budu cítit?

Po podání vakcíny se pravděpodobně budete cítit pod psa. Ve studiích se nežádoucí účinky obvykle objevily první nebo druhý den po očkování a poté trvaly jeden nebo dva dny. Ačkoliv nemusíte mít vedlejší účinky, aby vakcína fungovala, jsou jen známkou toho, že vakcína dělá to, co má! Z vakcíny nemůžete dostat infekci covidem-19.

Krátkodobé nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

- pocit bolesti v paži
- pocit silné únavy
- bolest hlavy
- horečku
- bolest svalů
- zimnici

Po bolestech paží byla nejčastějším vedlejším účinkem silná únava. Například po každé dávce vakcíny Pfizer asi čtyři z pěti lidí hlásili bolavé rameno nebo reakci tam, kam dostali vakcínu. Je možné, že budete pozorovat nežádoucí účinek, který zde není uveden.

Po první i druhé dávce vakcíny se mohou vyskytnout nežádoucí účinky.

- Někdo má vedlejší účinky po první dávce.